



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM ADULTOS PORTADORES DE TOSSE CRÔNICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

Ana Beatriz Sá de Souza¹, Andrezza Araújo de Oliveira Duarte²

RESUMO

A tosse é caracterizada como crônica quando permanece por um período maior ou igual a 8 semanas, culminando na diminuição do bem-estar do paciente nas esferas social, psicológica e física. Este trabalho propõe-se a avaliar a qualidade de vida em adultos portadores de tosse crônica no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) em Campina Grande-PB. Este é um estudo prospectivo de caráter exploratório e transversal. 25 pacientes em consulta no ambulatório de pneumologia do HUAC responderam ao questionário Leicester Cough Questionnaire (LCQ), seguido do preenchimento de uma ficha de anamnese. A média das pontuações no LCQ nas esferas física, psicológica e social foram, respectivamente, 3,86, 4,421 e 4,55. A média do total de pontos foi 11,831. A ciência da etiologia da tosse não demonstrou aumento na qualidade de vida em comparação ao não conhecimento ($t(23) = 1,398$; $(p > 0,05)$) e também não houve diferença de pontuações entre o estabelecimento do tratamento ou não estabelecimento ($t(23) = 0,383$; $(p > 0,05)$). Concluiu-se que a tosse teve um impacto relevante na qualidade de vida dos entrevistados avaliada pelo LCQ. Mas se faz necessário um estudo mais amplo para que a população seja melhor representada.

Palavras-chaves: tosse crônica; qualidade de vida; qualidade de vida relacionada à tosse.

¹Aluna do curso de medicina, Unidade Acadêmica de Medicina (UAM), UFCG, Campina Grande, PB, e-mail: beeeatriz.ss@hotmail.com

²Professora Mestra do curso de medicina, UAM, UFCG, Campina Grande, PB, e-mail: amduartecg@uol.com.br



EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH CHRONIC COUGH AT UNIVERSITY HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

Ana Beatriz Sá de Souza¹, Andrezza Araújo de Oliveira Duarte²

ABSTRACT

Cough is characterized as chronic when it remains for a period greater or equal than 8 weeks, culminating in a decrease in the patient's well-being in the spheres social, psychological and physical. This study aims to assess the quality of life of adults with chronic cough at the University Hospital Alcides Carneiro (HUAC) in Campina Grande-PB. This is a prospective, exploratory, cross-sectional study in which 25 patients in consultation at the HUAC pulmonology clinic answered the Leicester Cough Questionnaire (LCQ) questionnaire, followed by filling out an anamnesis form. The average of the LCQ scores in the physical, psychological and social spheres were, respectively, 3.86, 4.421 and 4.55 points. The average of the total points was 11,831. The awareness of the etiology of cough did not increase quality of life compared to not awareness ($t(23) = 1,398$; ($p > 0.05$) and there was also no difference in scores between treatment establishment or non-establishment ($t(23) = 0.383$; ($p > 0.05$). It was concluded that cough had a relevant impact on the quality of life of respondents assessed by the LCQ, but a expanded study is needed so that the population is better represented.

Keywords: chronic cough; quality of life; cough-related quality of life.